

La mejor Prevención es la Vacunaciónhay que continuar acatando las recomendaciones del Ministerio de Salud....

La Difteria



¿Qué es?

Es una enfermedad infecciosa aguda, causada por la bacteria **CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE**.

SÍNTOMAS

(SE MANIFIESTAN ENTRE 2 Y 5 DÍAS DESPUÉS DE LA EXPOSICIÓN)

-  DOLOR DE GARGANTA
-  FIEBRE
-  HINCHAZÓN DE UNA PARTE DEL CUELLO. (2-5 DÍAS)
-  TOS SECA
-  PRESENCIA DE UNA MEMBRANA BLANCA GRISÁCEA EN LA GARGANTA.

TRANSMISIÓN

-  POR VÍA AÉREA (TOSER O ESTORNUDAR)
-  POR CONTACTO DIRECTO
-  POR TEJIDOS U OBJETOS CONTAMINADOS

DIAGNÓSTICO

SEGÚN LOS SÍNTOMAS PRESENTADOS, LUEGO DE HABER ESTADO EXPUESTO A OTROS ENFERMOS DE DIFTERIA, Y CORROBORADO POR EXÁMENES DE LABORATORIO.

TRATAMIENTO

INYECCIÓN INTRAVENOSA O INTRAMUSCULAR DE SOLUCIÓN DE ANTITOXINA DIFTÉRICA.

 ANTIBIÓTICOS

COMPLICACIONES

- PUEDEN SER MORTALES:
-  INFLAMACIÓN Y LESIÓN DEL MIOCARDIO Y ALTERACIONES DEL RITMO CARDÍACO.
 -  INFLAMACIÓN DE LOS NERVIOS.
 -  PROBLEMAS RENALES O TRASTORNOS.
 -  HEMORRÁGICOS POR CAÍDA DEL NIVEL DE PLAQUETAS.
 -  PARÁLISIS.

¿Se puede prevenir?

Si, mediante la aplicación de TRES DOSIS DE VACUNAS DURANTE EL PRIMER AÑO DE VIDA y refuerzos posteriores.

¡Vacuna a tu niño ya!